

4.9.2 ATTREZZATURA

- Fonendoscopio
- sfigmomanometri con bracciali pediatrici e adulti
- bombola di ossigeno anche monouso (attenzione alla manutenzione ed alla scadenza) e relative mascherine di diversa misura
- pallone di Ambu con mascherine di misura diversa
- cannule di Guedel di misura diversa, (da posizionare quando è necessario il mantenimento della pervietà delle vie aeree ed evitare la caduta all'indietro della lingua)
- lacci emostatici
- siringhe da insulina (1ml = 100U)
- 3 / 4 aghi, cannula 20G, 22G e 24G
- Butterfly 21G e 5 butterfly 23G
- rubinetto a 3 vie
- garze sterili

- piantane
- deflussori
-
- guanti monouso
- 1 pila a lucciola
- cerotti di seta e carta
- forbici
- siringhe da 2,5, 5 e 10 cc.
- abbassalingua
- cotone idrofilo
- disinfettanti per cute
- fisiologica fiale da ml.10 e in fleboclisi da 100 cc e 250 cc

farmaci:

- adrenalina fiale 1:1000 da conservare in frigorifero (o meglio Fastjekt adulto
adulti: conservare a temperatura ambiente)
- idrocortisone (idrocortisone: Flebocortid 100 - 250 - 500 - 1000 mg).
- antistaminico (clorfeniramina - Trimeton - fiale 1ml = 10mg), sciroppo (1ml = 0,5mg)
- beta 2 agonista (salbutamolo per aerosol con distanziatore per bambini)

Asl di Milano S.C. Igiene e Sanità Pubblica SS Profilassi Malattie infettive e Vaccinazioni Via Statuto 5 Tel. 02-85789733 direzione.serviziogiennesanitàpubb ca@asl.milano.it	 Regione Lombardia ASL Milano	IOSp PercorsoVacc P 7 ISO 9001:2008
	Istruzione Operativa Specifica di processo GESTIONE DEL PERCORSO VACCINALE	Pagina 26 di 29 Rev. 01 Data diff. 15.07.2010

Dosaggio Adrenalina FASTJEKT:

- FASTJEKT Junior da utilizzarsi per bambini e fanciulli di peso inferiore ai 45 kg
- FASTJEKT per fanciulli ed adulti di peso superiore ai 45 Kg.

Il Fastjekt è pronto all'uso:

- Togliere il tappo grigio
- Prendere in mano Fastjekt tenendo l'estremità in plastica nera a contatto con la coscia e premere con forza sulla pelle: si sentirà lo scatto dell'ago
- Tenere Fastjekt in detta posizione per almeno 10 secondi, fino a quando l'ago sia penetrato nella pelle e sia stata iniettata l'adrenalina. In nessun caso allontanare Fastjekt dalla coscia prima della fine dell'iniezione!
- Allontanare quindi Fastjekt dalla coscia e massaggiare il punto di iniezione per circa 10 secondi.

Dosaggio Adrenalina FIALE 1:1000

0,01 ml/Kg per via i.m. (siringhe da insulina o da tubercolina)

Kg	ml
5	0,05
7	0,07
10	0,10
15	0,15
20	0,20
25	0,25
30	0,30
50	0,50 (1/2 fiala)
80	0,80

Asl di Milano S.C. Igiene e Sanità Pubblica SS Profilo Malattie infettive e Vaccinazioni Via Statuto 5 Tel. 02-85789733 direzione.serviziogiene@aslpubbli ca@asl.milano.it	 Regione Lombardia ASL Milano	IOSp PercorsoVacc P 7 ISO 9001:2008
	Istruzione Operativa Specifica di processo GESTIONE DEL PERCORSO VACCINALE	Pagina 27 di 29 Rev. 01 Data diff. 15.07.2010

Dosaggio Cortisone

In base al peso corporeo somministrare per via endovenosa o, se non possibile, per via intramuscolare.

Dose di attacco 15 - 20 mg/kg di peso corporeo EV

Kg	IDROCORTISONE (Flebocortid)
5 - 6	100 mg
7,5	150 mg
10	200 mg
30	500 mg
40	800 mg
50 e oltre	1000 mg

Dosaggio Antistaminico

Somministrare per via i.m.

Kg	Clorfeniramina (Trimeton)
5 - 6	1 mg = 0,1 ml
9 - 12	2 mg = 0,2 ml
25	5 mg = 0,5 ml
50 e oltre	10 mg = 1 ml